

PCP (Phencyclidine)

Le PCP, en 1950, était utilisé comme anesthésique général et analgésique, mais il a été retiré à cause des effets indésirables importants tels que des convulsions au cours des opérations chirurgicales et après il causait de l'agitation, désorientation, délire, hallucinations.

Argotisme : Angel dust (poussière d'ange), peace pill (pilule de la paix), elephant tranquiliser, horse tranquiliser, DOA (dead on arrival), HOG, cristal (cristaux), cyclone.

Effets à court terme : À faibles doses

Système nerveux central :

Problèmes d'élocution, incoordination motrice, contraction des pupilles, vision brouillée, quelquefois étourdissements, euphorie légère et intense, relaxation, sentiment de détachement du réel, distorsion de l'image corporelle, impression de flotter dans l'espace, engourdissement des extrémités, problème de concentration

Autres : augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle, augmentation du rythme respiratoire, mais la respiration est plutôt superficielle, augmentation de la température corporelle, transpiration abondante, nausées, vomissements.

À fortes doses

Système nerveux central :

Comportements bizarres et erratiques, désorganisation psychologique sévère, psychose toxique, comportement violent ou hostile, hallucination, panique et terreur occasionnelle

Autres : arythmies cardiaques, respiration lente, superficielle et irrégulière, nausées, vomissements sévères, augmentation de la salivation, alternance de fièvre et de frissons.

Surdose : coma, convulsions, mort (par arrêt respiratoire)

Effets à long terme : Problème de mémoire, altération de la pensée, problème d'élocution importante, anxiété sévère, dépression (suicide), comportement imprévisible (violence), retrait social, psychose toxique, flashback.

Une surdose de PCP peut entraîner des convulsions, le coma, l'hyperthermie et la mort.

Sous l'influence du PCP, les consommateurs peuvent s'automutiler, se suicider et faire d'horribles meurtres.

Une détérioration permanente du cerveau est également possible

L'effet peut durer de 3 à 8 heures voire même jusqu'à quelques jours dépendant de la dose due à l'accumulation dans les graisses de l'organisme.

Dépendances : Il y a une dépendance psychologique au PCP, mais il n'y a pas de dépendance physique.

Nous pouvons retrouver des traces de PCP dans l'urine jusqu'à une semaine plus tard après la prise. Pour un utilisateur occasionnel, le PCP peut se retrouver dans le sang de 2 à 7 jours et pour un utilisateur chronique à dose élevée, nous pouvons en retrouver pendant plusieurs mois.